

Álgebra II. Hoja de ejercicios 1: Subanillos, homomorfismos, álgebra de grupo

Universidad de El Salvador, ciclo par 2018

Por cualquier pregunta, no duden en escribir al grupo ues-algebra-2@googlegroups.com.

Subanillos

Ejercicio 11.1. Verifique que hay una cadena de subanillos

$$\mathbb{Z}[\sqrt{5}] \subset \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right] \subset \mathbb{R}$$

donde

$$\mathbb{Z}[\sqrt{5}] := \{a + b\sqrt{5} \mid a, b \in \mathbb{Z}\}, \quad \mathbb{Z}\left[\frac{1+\sqrt{5}}{2}\right] := \left\{a + b\frac{1+\sqrt{5}}{2} \mid a, b \in \mathbb{Z}\right\}.$$

Ejercicio 11.2. Consideremos el anillo de las funciones $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ respecto a las operaciones **punto por punto**

$$(f + g)(x) := f(x) + g(x), \quad (f \cdot g)(x) := f(x) \cdot g(x).$$

Demuestre que hay una cadena de subanillos

$$\begin{aligned} \{\text{funciones constantes } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\} &\subset \{\text{funciones polinomiales } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\} \\ &\subset \{\text{funciones continuas } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\} \subset \{\text{funciones } \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}\}. \end{aligned}$$

Homomorfismos de anillos

Ejercicio 11.3. Sea R un anillo conmutativo y $M_n(R)$ el anillo de las matrices de $n \times n$ con coeficientes en R . ¿Cuáles aplicaciones de abajo son homomorfismos?

1) La proyección

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} \mapsto x_{11}.$$

2) La traza

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} \mapsto x_{11} + x_{22} + \cdots + x_{nn}.$$

3) El determinante $A \mapsto \det A$.

Ejercicio 11.4. Sea $f: R \rightarrow S$ un homomorfismo de anillos conmutativos y sea $n = 1, 2, 3, \dots$

1) Demuestre que f induce un homomorfismo de los anillos de matrices correspondientes $f_*: M_n(R) \rightarrow M_n(S)$ dado por

$$\begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \cdots & x_{1n} \\ x_{21} & x_{22} & \cdots & x_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_{n1} & x_{n2} & \cdots & x_{nn} \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} f(x_{11}) & f(x_{12}) & \cdots & f(x_{1n}) \\ f(x_{21}) & f(x_{22}) & \cdots & f(x_{2n}) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ f(x_{n1}) & f(x_{n2}) & \cdots & f(x_{nn}) \end{pmatrix}.$$

- 2) Demuestre que f induce un homomorfismo de grupos $\text{GL}_n(f): \text{GL}_n(R) \rightarrow \text{GL}_n(S)$.
- 3) Demuestre que el diagrama de homomorfismos de grupos

$$\begin{array}{ccc} \text{GL}_n(R) & \xrightarrow{\det} & R^\times \\ \text{GL}_n(f) \downarrow & & \downarrow f^\times \\ \text{GL}_n(S) & \xrightarrow{\det} & S^\times \end{array}$$

conmuta.

(Sugerencia: use la fórmula $\det(x_{ij}) = \sum_{\sigma \in S_n} \text{sgn } \sigma \cdot x_{1\sigma(1)} \cdots x_{n\sigma(n)}$.)

Ejercicio 11.5. Sea R un anillo conmutativo. Calcule $Z(M_n(R))$, el centro del anillo de las matrices de $n \times n$ con coeficientes en R .

(Véanse los ejercicios donde calculamos el centro del grupo lineal general $\text{GL}_n(R)$.)

Ejercicio 11.6.

- 1) Demuestre que un isomorfismo de anillos $R \rightarrow S$ se restringe a un isomorfismo de grupos $R^\times \rightarrow S^\times$.
- 2) Demuestre que los anillos de polinomios $\mathbb{Z}[X]$ y $\mathbb{Q}[X]$ no son isomorfos.

Ejercicio 11.7. Sea $f: R \rightarrow S$ un homomorfismo sobreyectivo de anillos. Demuestre que $f(Z(R)) \subseteq Z(S)$.

Álgebra de grupo

Ejercicio 11.8. Sea R un anillo conmutativo y G un grupo. Demuestre que

$$\begin{aligned} \epsilon: R[G] &\rightarrow R, \\ \sum_{g \in G} a_g g &\mapsto \sum_{g \in G} a_g \end{aligned}$$

es un homomorfismo sobreyectivo de anillos.

Ejercicio 11.9. Sea R un anillo conmutativo y G un grupo finito. Consideremos $t := \sum_{g \in G} 1 \cdot g \in R[G]$. Demuestre que $t^2 = |G|t$.

Ejercicio 11.10. En este ejercicio vamos a calcular el centro del álgebra de grupo $R[G]$. Consideremos

$$x = \sum_{g \in G} a_g g \in R[G].$$

- 1) Demuestre que $x \in Z(R[G])$ si y solamente si $hx = xh$ para todo $h \in G$.
- 2) Deduzca que $x \in Z(R[G])$ si y solamente si $a_g = a_{hgh^{-1}}$ para cualesquiera $g, h \in G$.

Entonces, el centro de $R[G]$ consiste en los elementos $\sum_{g \in G} a_g g$ cuyos coeficientes a_g son constantes sobre las clases de conjugación de G .