

## Álgebra I. Hoja de ejercicios 3: Anillos (continuación)

Universidad de El Salvador, ciclo impar 2019

---

Por cualquier pregunta, no duden en escribir al grupo [ues-algebra-2019@googlegroups.com](mailto:ues-algebra-2019@googlegroups.com).

### Ejercicio 1.

- 1) Sean  $A$  un anillo conmutativo y  $x, y \in A$  dos nilpotentes. Demuestre que  $x + y$  es también nilpotente.  
Sugerencia: calcule  $(x + y)^n$  usando el teorema del binomio.
- 2) En el anillo de matrices  $M_2(A)$  encuentre  $a, b \in M_2(A)$  tales que  $a$  y  $b$  son nilpotentes, pero  $a + b$  no es nilpotente.

**Ejercicio 2.** Sea  $A$  un anillo. Demuestre que si  $x \in A$  es nilpotente, entonces  $1 \pm x$  es invertible en  $A$ .  
Sugerencia: revise la fórmula para la serie geométrica  $\sum_{k \geq 0} x^k$ .

**Ejercicio 3.** Consideremos las matrices con coeficientes en cualquier anillo conmutativo  $A$ .

- 1) Demuestre que las matrices de la forma

$$\begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} \\ 0 & 0 & a_{23} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

son nilpotentes.

- 2) En general, demuestre que toda **matriz triangular superior estricta** de  $n \times n$ ; es decir  $a \in M_n(A)$  con  $a_{ij} = 0$  para  $i \geq j$  (la diagonal es también nula) es nilpotente.

**Ejercicio 4.** Sea  $a \in M_n(A)$  una matriz triangular superior estricta. Demuestre que

$$(1 - a)^{-1} = 1 + a + a^2 + a^3 + \dots + a^{n-1}.$$

**Ejercicio 5.** Sea  $A$  un dominio.

- 1) Demuestre que para todo  $a \neq 0$  la aplicación

$$\mu_a: A \rightarrow A, \quad x \mapsto ax$$

es inyectiva.

- 2) Demuestre que si  $A$  es un dominio finito, entonces la aplicación  $x \mapsto ax$  es biyectiva.
- 3) Deduzca de lo anterior que todo dominio finito es un cuerpo.

**Ejercicio 6.** Sean  $L$  un cuerpo y  $K \subseteq L$  un subcuerpo. Demuestre que  $L$  es un espacio vectorial sobre  $K$ .

### Ejercicio 7.

- 1) Calcule la dimensión del espacio vectorial
  - a)  $\mathbb{C}$  sobre  $\mathbb{R}$ ,
  - b)  $\mathbb{Q}(\sqrt{n})$  sobre  $\mathbb{Q}$ , donde  $n \neq 1$  es libre de cuadrados.
- 2) Demuestre que  $\mathbb{R}$  tiene dimensión infinita sobre  $\mathbb{Q}$ .

Sugerencia: recuerde que  $\mathbb{R}$  no es un conjunto numerable.

**Ejercicio 8.** Sean  $A$  un dominio y  $\text{Frac } A$  su cuerpo de fracciones. Demuestre explícitamente todos los axiomas de anillos (anillos conmutativos, cuerpos) para  $\text{Frac } A$ .

### Ejercicio 9.

- 1) En el anillo de las series formales  $\mathbb{Z}[[X]]$  demuestre que los siguientes elementos son invertibles y encuentre sus inversos:

$$f(X) = X^2 - 2X + 1, \quad g(X) = 1 - X - X^2.$$

- 2) Generalizando estos cálculos, demuestre que una serie formal es invertible si y solo si su término constante es invertible:

$$A[[X]]^\times = \left\{ \sum_{i \geq 0} a_i X^i \mid a_0 \in A^\times \right\}.$$

**Ejercicio 10.** Sea  $k$  un cuerpo. Una **serie de Laurent** es una serie formal que puede tener un número finito de términos  $a_i X^i$  con  $i < 0$ :

$$f(X) = \sum_{i \geq -k} a_i X^i = a_{-k} X^{-k} + a_{-k+1} X^{-k+1} + \dots + a_{-1} X^{-1} + a_0 + a_1 X + a_2 X^2 + a_3 X^3 + \dots,$$

donde  $a_i \in k$ . Demuestre que las series de Laurent forman un cuerpo. Este se denota por  $k((X))$ .